

Cáncer cervical Puerto Rico: 2009-2013

datos del 2013 son preliminares


CENTRO
COMPRESIVO
DE
CÁNCER
universidad de puerto rico

REGISTRO
CENTRAL
DE
CÁNCER
DE PUERTO RICO



El cáncer cervical comienza a desarrollarse en el cuello del útero. El cérvix es la parte que conecta la vagina con la parte inferior del útero.

FACTORES DE RIESGO



Basado en los datos del periodo 2009-2013, **1 de cada 91 mujeres** que nazcan hoy en Puerto Rico podría desarrollar cáncer cervical durante su vida.



1,247 casos nuevos

280 muertes

Síntomas:

- Sangrado vaginal inusual
- Flujo vaginal inusual
- Dolor pélvico
- Dolor o sangrado luego de las relaciones sexuales



Desde el año 1987 hasta el 2013 la incidencia de cáncer cervical se ha mantenido estable. Mientras que la mortalidad ha disminuido 1.4% por año.

Tasas de incidencia y mortalidad (por cada 100,000 mujeres)

Incidencia 12.6

Mortalidad 2.6



7^{mo}

tipo de cáncer más diagnosticado en mujeres



El 24% de los diagnósticos nuevos de cáncer cervical fue en el grupo de edad de 40 a 49 años.



El 18% de las muertes por cáncer cervical fue en el grupo de edad de 60 a 69 años.

Prevención y pruebas de detección temprana



Vacuna contra el VPH
(11-26 años)



Prueba Pap



Prueba de VPH

La detección del cáncer cervical en etapa temprana incrementa la oportunidad de sobrevivencia y una mejor calidad de vida. Vacune a sus hijos y hágase las pruebas de cernimiento a tiempo. Consulte a su médico.